



FLUVET®

Reg. Q-1196-017. Uso veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Flumetasona. Solución Inyectable Estéril.

FÓRMULA

Cada mL contiene:

Flumetasona	0.5 mg
Excipiente c.b.p./c.s.p.	1 mL

DESCRIPCIÓN

La Flumetasona es un corticosteroide que se ha formulado por una modificación en la molécula de prednisolona. Esta variante ha dado como resultado mejores efectos antiinflamatorios y gluconeogénicos. **FLUVET®** combinado con la terapia antibiótica adecuada brinda buenos resultados en padecimientos bacterianos ya que rompe la barrera inflamatoria permitiendo el paso del antibiótico al foco infeccioso.

INDICACIONES

FLUVET está indicado en todas aquellas afecciones musculares esqueléticas donde exista inflamación, así mismo en aquellas inflamaciones que involucren una infección siempre y cuando se combine con el antibiótico adecuado.

FLUVET también está indicado en los trastornos de orden metabólico en donde la glucosa circulante baja (cetosis), y gracias a su efecto gluconeogénico, está recomendado en los casos de estrés y shock debido a que en estos procesos existe gasto de energía.



La imagen del producto es de referencia.

PRESENTACIÓN

Caja con 1 frasco	
10 mL	50 mL

INDICADO EN



**FLUVET®**

Reg. Q-1196-017. Uso veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Flumetasona. Solución Inyectable Estéril.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

**Intramuscular, intravenosa, intraarticular, intralesional y subcutánea.**

- **Equinos:** de 1.25 a 2.5 mg/ animal/ cada 24 horas, por vía IV, IM o intraarticular (2.5 a 5 mL). Repetir el tratamiento en caso de ser necesario a criterio del Médico Veterinario.
- **Caninos:** de 0.06 a 0.25 mg/ animal/ cada 24 horas, por vía IV, IM o SC (0.12 a 0.5 mL). Repetir el tratamiento en caso de ser necesario a criterio del Médico Veterinario.
- **Felinos domésticos:** de 0.03 a 0.125 mg/ animal/ cada 24 horas, por vía IV, IM o SC (0.06 a 0.25 mL). Repetir el tratamiento en caso de ser necesario a criterio del Médico Veterinario.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Las precauciones y contraindicaciones usuales para corticosteroides son aplicables a este producto.



No administrar en equinos destinados al consumo humano.



La terapia continua y a dosis altas de FLUVET puede provocar supresión de la función suprarrenal. En tal caso se recomienda suspender temporalmente la terapia y estimular las suprarrenales con ACTH.



En animales con cuadros infecciosos es recomendable administrar FLUVET en combinación con agentes antimicrobianos.



Después de una terapia prolongada con FLUVET se recomienda suspender gradualmente el tratamiento.



Consulte al Médico Veterinario.



No se administre a hembras gestantes.



Su venta requiere receta médica.

ALMACENAMIENTO



Conservar a una temperatura entre 15° y 30°C, en lugar fresco y seco alejado de la luz solar.



Conservar fuera del alcance de los niños animales domésticos.