

FLUSURE® XP

Reg. B-1196-258. Uso veterinario.

Virus inactivos

FÓRMULA

Cada dosis de 2 ml contiene:

Fracción liofilizada Virus de la Influenza Porcina
Tipo A H1N1, H1N2 y H3N2.

Diluyente:


Amphigen® emulsión 0.1 mL
Agua estéril c.b.p. 2 mL

DESCRIPCIÓN

Vacuna contra la Influenza Porcina tipo A H1N1, H1N2 y H3N2. Se ha establecido una duración de la inmunidad de 10 semanas contra Virus de la Influenza Porcina Tipo A H3N2.

INDICACIONES

Para la vacunación de cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores, incluyendo cerdas jóvenes y cerdas gestantes, como auxiliar en la prevención de enfermedades respiratorias causadas por los virus de Influenza Porcina.



PRESENTACIÓN

Frasco con 50 dosis, 100 mL de diluyente	Frasco con 250 dosis, 500 mL de diluyente
---	--

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

- **Dosis:** Administrar 2 mL vía intramuscular.
- Los cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores deben recibir dos dosis de 2 mL administradas aproximadamente con 3 semanas de diferencia.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- No vacunar 21 días antes del sacrificio.
- Rehidratar asepticamente el frasco de vacuna liofilizada con el diluyente estéril incluido.
- Usar jeringas y agujas estériles para administrar esta vacuna.
- Contiene gentamicina como agente conservador.
- Disponer de los envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.
- Como con muchas vacunas, puede ocurrir anafilaxia después del uso. Se recomienda el antídoto inicial de epinefrina seguido de la terapia de soporte apropiada.
- **Consulte al Médico Veterinario.**

USO



- En cerdos jóvenes vacune después de que los anticuerpos maternos de del virus de la Influenza Porcina Tipo A hayan disminuido.
- Se recomienda la revacunación semi-anual con una sola dosis.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar entre 2° y 7° C.
- No congelar este producto.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.