

FOSTERA® PRRS

Reg. B-1196-247. Uso Veterinario.

Virus vivo modificado

FÓRMULA

Cada dosis contiene virus vivos modificados de la enfermedad de PRRS, cepa P129.

DESCRIPCIÓN

Para la vacunación de cerdos sanos susceptibles al virus de PRRS en hatos positivos, como una ayuda en la prevención de la Enfermedad Reproductiva y Respiratoria causada por el virus de PRRS. Se ha demostrado una duración de la inmunidad de 19 semanas contra la enfermedad reproductiva en cerdos vacunados antes de su reproducción. Se ha demostrado una duración de la inmunidad de 26 semanas contra la enfermedad respiratoria.

INDICACIONES

Vacunar a cerdos de un día de edad o mayores. La seguridad de este producto ha sido demostrada cuando las cerdas primerizas y cerdas multiparas son vacunadas antes de la reproducción o en cualquier etapa de la gestación; sin embargo, se ha demostrado la protección contra la enfermedad reproductiva cuando los animales fueron vacunados 6 semanas previas a la reproducción.



PRESENTACIÓN

Frasco con 50 dosis

USO



CERDOS



LECHONES

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

- Rehidratar asépticamente la fracción liofilizada con el diluyente estéril provisto, agitar bien.
- Administrar asépticamente una dosis única de 2 mL intramuscularmente en cerdos de un día de edad o mayores.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- No vacunar 21 días antes del sacrificio.
- Usar todo el contenido del frasco una vez reconstituido.
- No vacunar a sementales en edad reproductiva.
- Contiene Gentamicina como conservador.
- Usar jeringas y agujas estériles para administrar esta vacuna.
- Como con muchas vacunas puede ocurrir anafilaxis después de su uso.
- Se recomienda epinefrina como antídoto inicial.
- Incinerar el envase y todo el contenido que no se haya utilizado.
- **Consulte al Médico Veterinario** para el uso y calendarios de vacunación.

FOSTERA® PRRS

Reg. B-1196-247. Uso Veterinario.

Virus vivo modificado

ALMACENAMIENTO

- No exponer a la luz solar. Almacenar entre 2° y 7° C.
- No congelar.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

EXCRECIÓN Y TRANSMISIÓN DEL VIRUS DE LA VACUNA POR CERDOS VACUNADOS

- El virus de la vacuna puede ser eliminado y transmitido a otras poblaciones de cerdos que están en contacto directo o indirecto con cerdos vacunados.
- La duración de la transmisión potencial del virus de la vacuna puede variar. Los cerdos no vacunados en contacto con cerdos vacunados con **Fostera® PRRS**, pueden seroconvertir al virus de la vacuna.
- El uso de esta vacuna está contraindicado en hatos destinados a mantenerse seronegativos al virus de PRRS.