

EMICINA®/LA

Reg. Q-1196-115. Uso veterinario.

Solución inyectable

FÓRMULA

Cada ml contiene:

Oxitetraciclina dihidrato	215.6 mg (equivalente a 200 mg de oxitetraciclina base)
Excipientes c.b.p.	1 ml

DESCRIPCIÓN

Antibacteriano en solución inyectable. La oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro contra la mayoría de las bacterias gram (+) y gram (-).

INDICACIONES

Antibiótico de amplio espectro y larga acción para el tratamiento de las enfermedades de los bovinos, ovinos y caprinos, causadas por bacterias sensibles a la acción de este antibiótico.

PRESENTACIÓN

Frasco 100 ml	Frasco 250 ml
---------------	---------------



USO



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda / Subcutánea

- 1 ml por cada 10 kg de peso. El producto está diseñado para la aplicación intramuscular profunda de una dosis única. Los niveles terapéuticos que se obtienen con esta dosis única, se mantienen durante 2 a 3 días.
- Emicina®/LA puede ser administrada por vía intramuscular o subcutánea en bovinos.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- **Tiempo de retiro en bovinos:**
Leche: 7 días. Carne: 37 días.
- **Tiempo de retiro en ovinos:** Carne vía IM: 22 días.
- **Tiempo de retiro en cabras:** Carne vía IM: 33 días.
- El producto no deberá administrarse el mismo día que se aplica hierro.
- Se recomienda que dosis mayores a 10 ml en bovino y 5 ml en ovino y caprino, se distribuyan en dos puntos de aplicación.
- **Consulte al Médico Veterinario. Su venta requiere receta médica.**

ALMACENAMIENTO

- **Conservar este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Almacenar por debajo de 25° C.
- Conservar en lugar fresco.
- Disponer del envase vacío de acuerdo con las regulaciones locales.