

EXCENEL® RTU EZ

Reg. Q-1196-145. Uso veterinario.

Suspensión estéril inyectable

FÓRMULA

Cada ml de esta suspensión estéril lista para usarse contiene Clorhidrato de Ceftiofur equivalente a 50 mg de Ceftiofur, 2.5 mg de monooleato de polioxietileno sorbitano (polisorbato 80), 6.5 mg de agua inyectable en una suspensión de triglicérido caprílico/cáprico.

DESCRIPCIÓN

EXCENEL® RTU EZ suspensión estéril es una formulación lista para usarse que contiene la sal clorhidrato de ceftiofur, que es un antibiótico de amplio espectro del grupo de las cefalosporinas.

INDICACIONES

EXCENEL® RTU EZ suspensión estéril está indicado para el tratamiento de las siguientes enfermedades bacterianas:

- **Enfermedades respiratorias del bovino** (BRD por sus siglas en inglés, fiebre de embarque, neumonía) asociadas con *Mannheimia haemolytica*, *Pasturella multocida* e *Histophilus somni*.
- **Necrobacilosis interdigital aguda del bovino** (gabarro, pododermatitis) asociada con *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogénicos*.
- **Metritis aguda** (de 0 a 14 días post-partum) asociada con bacterias susceptibles al ceftiofur.



IMAGEN SOLO DE REFERENCIA

PRESENTACIÓN

Frasco 100 ml

USO



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular / Subcutánea

- **Para las enfermedades respiratorias y la necrobacilosis interdigital aguda del bovino:** Administrar por vía intramuscular o subcutánea una dosis de 1.1 a 2.2 mg de CE/kg (0.5 a 1 mg CE/lb) peso corporal (1 a 2 ml de la suspensión estéril por cada 45 kg de peso corporal).

Administrar diariamente a intervalos de 24 horas por un total de tres días consecutivos. Se pueden administrar tratamientos adicionales los días 4 y 5 a los animales que no muestren una respuesta satisfactoria (que no se hayan recuperado) después del tratamiento inicial de tres días.

Además, contra las enfermedades respiratorias del bovino solamente, administrar por vía intramuscular o subcutánea 2.2 mg CE/kg (1 mg CE/lb) de peso corporal cada tercer día, los días 1 y 3 (intervalo de 48 horas). No inyectar más de 15 ml por sitio de inyección.

La selección de la dosis (de 1.1 a 2.2 mg CE/kg) así como el régimen y la duración del tratamiento (diario o cada tercer día sólo para las enfermedades respiratorias del bovino) se deberán basar en una evaluación de la severidad de la enfermedad, la susceptibilidad de los patógenos y las respuesta clínica.

- **Para la metritis aguda post-parto:** Administrar por vía intramuscular o subcutánea a las dosis de 2.2 mg de CE/kg (1 mg CE/lb) de peso corporal (2 ml de la suspensión estéril por cada 45 kg de peso corporal). Administrar a intervalos de 24 horas por 5 días consecutivos. No inyectar más de 15 ml por sitio de inyección.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Agite bien antes de usar.
- No es para uso humano.
- Cuando se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta, dosis y vía de administración, los bovinos tratados no deben ser sacrificados 4 días después al último tratamiento. Cuando se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta, dosis y vía de administración, no se requiere tiempo de retiro en leche.

EXCENEL® RTU EZ

Reg. Q-1196-145. Uso veterinario.

Suspensión estéril inyectable

El uso o dosificación en exceso a los indicados o por vías de administración no aprobadas, como puede ser intramamaria, puede resultar en residuos ilegales en tejidos comestibles y/o en leche. No ha sido establecido un tiempo de retiro en becerros pre-rumiantes. No usarlo en becerros que se vayan a procesar para la producción de carne de ternera.

- Al igual que todos los fármacos, el uso de EXCENEL® RTU EZ Suspensión Estéril está contraindicado en animales que previamente se haya observado que sean hipersensibles a este medicamento.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a la penicilina o las cefalosporinas deben evitar la exposición a este producto.
- En caso de exposición accidental de los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de exposición accidental de la piel, lavar con agua y jabón. Quitarse la ropa contaminada.

ALMACENAMIENTO

- **Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Almacenar a temperatura ambiente controlada entre 20° a 25°C con excursiones permitidas de 15° a 40°C
- Protéjase de la congelación.
- El contenido debe ser utilizado 42 días después de haber extraído la primera dosis del frasco.

- Si ocurre una reacción alérgica (como enrojecimiento, urticaria o dificultad respiratoria), conseguir atención médica.
- Las penicilinas y las cefalosporinas pueden causar reacciones alérgicas en individuos sensibilizados. La exposición tópica a dichos antimicrobianos, incluyendo al ceftiofur, pueden producir reacciones alérgicas de leves a severas en algunos individuos. La exposición repetida o prolongada puede causar sensibilización, evitar el contacto directo del producto con piel, ojos, boca y ropa.
- **Consulte al Médico Veterinario.**
- **Su venta requiere receta médica.**