

CYDECTIN® NF

Reg. Q-1196-207. Uso veterinario.

Antiparasitario endectocida

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Moxidectina	1.5 g
-------------	-------

DESCRIPCIÓN

Cydectin® NF solución inyectable al 1%, es efectiva para el tratamiento y control de los parásitos internos y externos de los bovinos. Una dosis de bajo volumen brinda el completo control de los estadios adultos e inmaduros de los más importantes parásitos.

Cydectin® NF, un nuevo endectocida, se presenta como una solución estéril de moxidectina al 1% lista para usar.

La moxidectina se produce por modificación química de nemadectina, un producto de fermentación del microorganismo *Streptomyces cyaneogriseus* var. *noncyanogenus*.

Cuando se administra a razón de 1 ml/50 kg de peso corporal, **Cydectin® NF** al 1% provee 0.2 mg de moxidectina/kg de peso corporal.

INDICACIONES

Cydectin® NF, administrado a la dosis recomendada, es eficaz contra los siguientes parásitos del bovino:

Parásitos gastrointestinales: (estadios inmaduros y adultos): *Ostertagia ostertagi* (incluidos sus estadios inhibidos), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia mcmasteri*, *Cooperia spatulata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Bunostomum phlebotomum*, *Trichuris ovis*, *Trichuris discolor*.

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*.

PRESENTACIÓN

Frasco con 250 ml

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

Cydectin® NF es administrado por inyección subcutánea delante o detrás de la paleta a la dosis de 0.2 mg de moxidectina por kg de peso corporal, es decir 1 ml/50 kg de peso corporal. Usar agujas de 10 a 15 mm calibre 16. Utilizar siempre material estéril y seguir procedimientos asépticos.

Peso (kg)	Dosis (ml)	Peso (kg)	Dosis (ml)
50	1	300	6
100	2	350	7
150	3	400	8
200	4	450	9
250	5	500	10

- Ubicación correcta para la administración:





IMAGEN SOLO DE REFERENCIA

Cydectin® NF, es también, a la misma dosis, efectivo contra los siguientes parásitos externos:

Garrapata común del ganado bovino: *Rhipicephalus microplus*.

Sarna: *Psoroptes bovis*.

Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus* y *Solenopotes capillatus*.

Cydectin® NF, a la misma dosis ayuda en el control de:

Piojo Masticador: *Bovicola bovis*.

USO



CYDECTIN® NF

Reg. Q-1196-207. Uso veterinario.

Antiparasitario endectocida

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Es compatible con otros tratamientos sanitarios de rutina en el ganado bovino, incluyendo las vacunaciones. Ningún otro producto inyectable podrá ser administrado junto con **Cydectin® NF** en el mismo lugar de aplicación.
- No emplear en becerros lactantes de corta edad afectados por desnutrición y/o enfermedades infecciosas.
- En animales debilitados o afectados por enfermedades infecciosas, se recomienda tratar las enfermedades previo a la administración de **Cydectin® NF**.
- Puede ser usado en toros y en vacas preñadas sin efectos negativos sobre su actividad reproductiva.
- Consulte a su Médico Veterinario para la asistencia en el diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades parasitarias.
- Nota: Dado que el producto será utilizado en circunstancias que escapan al control del elaborador, éste no se responsabiliza por las consecuencias que surjan del uso inadecuado del mismo.

- **Tiempo de retiro:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento. No destinar a consumo humano ni a su industrialización la leche proveniente de animales tratados.
- **Consulte al Médico Veterinario.**
- **Su venta requiere receta médica.**

ALMACENAMIENTO

- **Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Almacenar a temperatura entre 15° C y 30° C
- No exponer a la luz.
- Mantener este producto en su envase original.