

APOQUEL®

Oclacitinib

3.6 mg, Reg. Q-1196-719, 5.4 mg, Reg. Q-1196-717, 16 mg, Reg. Q-1196-718, Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Inmunomodulador para el tratamiento del prurito asociado con dermatitis alérgica y tratamiento de las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en perros.

FÓRMULA

Cada comprimido/tableta contiene:

Presentación	Apoquel® 3.6 mg	Apoquel® 5.4 mg	Apoquel® 16 mg
Maleato de Oclacitinib	*4.838 mg	*7.257 mg	*21.502 mg
Equivalentes a Oclacitinib	3.6 mg	5.4 mg	16 mg
Excipientes c.s.p.	1 comprimido/ tableta de 103.250 mg.	1 comprimido/ tableta de 154.875 mg.	1 comprimido/ tableta de 458.888 mg.


* La cantidad calculada está basada en una potencia teórica del 100% p/p de Maleato de Oclacitinib en una sustancia anhidra que es equivalente a 3.6% p/p actividad de base libre.

DESCRIPCIÓN

APOQUEL® (Maleato de Oclacitinib) es un inhibidor de la Janus Quinasa [JAK], por sus siglas en inglés]. Composición química de APOQUEL®:

(Maleato de Oclacitinib) N-metil [trans -4- (metil -7H- pirrolo [2,3-d] pirimidin-4-ilamino) ciclohexil] methanesulfonamida (2Z) -2- butenedioato.

Estructura química del Maleato de Oclacitinib



INDICACIONES

Para el tratamiento del prurito asociado con dermatitis alérgica y tratamiento de las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en perros a partir de los 12 meses de edad y con un peso mínimo de 3 kg de peso corporal.

PRESENTACIÓN

Caja con 20 tabletas		Caja con 100 tabletas	
3.6 mg	5.4 mg	16 mg	

INDICADO EN



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

- La dosis de APOQUEL® (Maleato de Oclacitinib) tabletas es de 0.4 - 0.6 mg de Oclacitinib/kg (0.18 - 0.27 mg de Oclacitinib/lb) peso corporal (p.c.), administrado de forma oral, dos veces al día durante 14 días y continuar una vez al día como terapia de mantenimiento.
- APOQUEL® puede administrarse con o sin alimento.

PERROS (kg)	Concentración y número de tabletas a administrar		
Bajo/alto	APOQUEL® 3.6 mg	APOQUEL® 5.4 mg	APOQUEL® 16 mg
3.0 - 4.4	1/2	-	-
4.5 - 5.9	-	1/2	-
6.0 - 8.9	1	-	-
9.0 - 13.4	-	1	-
13.5 - 19.9	-	-	1/2
20.0 - 26.9	-	2	-
27.0 - 39.9	-	-	1
40.0 - 54.9	-	-	1 1/2
55.0 - 80.0	-	-	2

APOQUEL[®]

Oclacitinib

3.6 mg, Reg. Q-1196-719, 5.4 mg, Reg. Q-1196-717, 16 mg, Reg. Q-1196-718, Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Inmunomodulador para el tratamiento del prurito asociado con dermatitis alérgica y tratamiento de las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en perros.

INSTRUCCIONES DE USO

- Precauciones especiales para su uso en animales.
- Cuando se trata el prurito relacionado con Dermatitis Alérgica con oclacitinib hay que investigar y diagnosticar el tipo de alergia (ej. Dermatitis Alérgica por pulgas, Dermatitis de contacto, hipersensibilidad alimentaria).
- Además en casos de dermatitis alérgica y dermatitis atópica, se recomienda investigar y tratar factores causantes de complicaciones, tales como infecciones/infestaciones bacterianas, micóticas o parasitarias (ej. pulga, sarna).
- Debido a su potencial efecto sobre ciertos parámetros clínico patológicos (ver reacciones adversas), en tratamientos a largo plazo se recomienda el monitoreo periódico con recuentos sanguíneos completos y bioquímica sérica.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- No administrar en perros menores a los 12 meses de edad; y con un peso menor de 3 kg de peso corporal.
- No está indicado para su uso en perros con infecciones graves.
- Puede aumentar la susceptibilidad a la infección, incluyendo demodicosis y exacerbación de condiciones neoplásicas.
- Este producto no está indicado para su uso en humanos.
- Para uso en perros solamente. Los perros deben ser observados detenidamente después de la administración para asegurar que cada tableta sea ingerida.
- Cualquier mitad de tableta restante debe ser colocado de nuevo en el blíster abierto y conservada (máx. 3 días) en el embalaje original de cartón.
- Lave las manos inmediatamente después de manipular las tabletas. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente a chorro con agua o solución salina durante al menos 15 minutos y consiga atención médica.
- No comer, beber o fumar durante el manejo del producto.
- En caso de ingestión, consiga atención médica inmediatamente.
- No está indicado para su uso en perros para reproducción, hembras gestantes o lactantes.
- No se ha evaluado en combinación con glucocorticoides, ciclosporina u otro agente inmunosupresor.
- Su venta requiere receta médica.
- Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar a temperatura ambiente controlada. Entre 20-25 °C (68-77 °F) con variación entre 15-30 °C (59-86 °F).
- Producto inflamable. Mantenga apartado del calor, las chispas y la llama abierta u otras fuentes de ignición.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.