

VANGUARD® PLUS 5/CV-L

Reg. B-1196-243. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Vacuna contra Distemper, Adenovirus Tipo 2, Coronavirus, Parainfluenza, Parvovirus Canino. Virus Activos Modificados y Virus Inactivo. Bacterina de *Leptospira canicola* y *Leptospira icterohaemorrhagiae*.

FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml contiene:

Fracción liofilizada:	
Virus Distemper Canino, Cepa N-CDV	≥10 ^{3.5} TCID ₅₀
Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan	≥10 ^{3.4} TCID ₅₀
Virus de Parainfluenza Canina, Cepa NL-CPI-5	≥10 ^{5.5} TCID ₅₀
Virus de Parvovirus Canino, Cepa NL-35-D	≥10 ^{7.2} TCID ₅₀
<i>Leptospira canicola</i> , Cepa C-51	≥600 UN
<i>L. icterohaemorrhagiae</i> , Cepa NADL (11403)	≥600 UN
Fracción Líquida (Diluente):	
Coronavirus Canino, Cepa NL-18	≥1.49 RP (Potencia Relativa)
Contiene gentamicina y timerosal como conservadores.	

Nota: TCID = Dosis Infectiva de Cultivo Celular

UN = Unidades nefelométricas

DESCRIPCIÓN

VANGUARD® PLUS 5/CV-L es una preparación liofilizada que contiene cepas atenuadas del virus de CD, CAV-2, virus CPI, CPV; y cultivos completos inactivados de *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*; más una preparación líquida de CCV inactivado adicionado con un adyuvante. El virus CPV de VANGUARD® PLUS 5/CV-L de alto título y bajo pasaje (35 pasajes a partir del aislamiento canino original, con un máximo permitido de 2 pasajes adicionales para la producción) en una línea celular canina, es altamente inmunogénica y capaz de estimular la inmunidad activa en presencia de anticuerpos maternos.

Este producto no contiene al CPV tipo 2c. La protección cruzada contra CPV tipo 2c fue demostrada en cachorros vacunados desafiados 5 semanas después de la segunda vacunación.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

- Indicaciones Generales:** Se recomienda la vacunación de perros sanos. Rehidratar asépticamente la vacuna liofilizada con el vial de vacuna líquida que la acompaña, agitar bien y administrar 1 ml subcutánea o intramuscularmente.
- Primovacunación:** Perros sanos de 6 semanas de edad o mayores deben recibir 3 dosis, administradas cada una con 3 semanas de separación.
- Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.



INDICACIONES

VANGUARD® PLUS 5/CV-L es para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o mayores, como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el virus de distemper canino (CD), la hepatitis infecciosa canina (ICH) causada por el adenovirus canino tipo 1 (CAV-1), la enfermedad respiratoria causada por el adenovirus canino tipo 2 (CAV-2), la parainfluenza canina causada por el virus de la parainfluenza canina (CPI), la enteritis causada por el coronavirus canino (CCV), parvovirus canino (CPV y CPV-2c), y la leptospirosis causada por *Leptospira canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.

PRESENTACIÓN

Blíster con 25 dosis	
25 frascos de 1 dosis de vacuna	25 frascos de 1 ml de vacuna líquida para usarla como diluente

INDICADO EN

PERROS ADULTOS	CACHORROS A PARTIR DE 6 SEMANAS DE EDAD.
----------------	--

VANGUARD® PLUS 5/CV-L

Reg. B-1196-243. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Vacuna contra Distemper, Adenovirus Tipo 2, Coronavirus, Parainfluenza, Parvovirus Canino. Virus Activos Modificados y Virus Inactivo.

Bacterina de *Leptospira canicola* y *Leptospira icterohaemorrhagiae*.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Utilizar todo el contenido una vez abierto.
- Se deberán utilizar jeringas y agujas esterilizadas para administrar esta vacuna. No esterilizar con químicos, porque la vacuna puede ser inactivada por trazas del desinfectante.
- Contiene gentamicina y timerosal como conservadores.
- Este producto no ha sido probado en animales gestantes.
- Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso. El antídoto inicial que se recomienda es la epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.
- Se ha demostrado que este producto es eficaz en animales sanos. Puede que no se provoque una respuesta inmune protectora si los animales están incubando una enfermedad infecciosa, están desnutridos o parasitados, están estresados por haber sido transportados, por las condiciones ambientales o están immunodeprimidos por otro motivo; o si la vacuna no es administrada siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
- Consulte al Médico Veterinario.
- Su venta requiere receta médica.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar verticalmente entre 2 a 7 °C. La exposición prolongada a altas temperaturas y/o los rayos directos del sol puede afectar la potencia en forma adversa.
- No congelar.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Incinerar los viales y todo el contenido no utilizado.