

EQUEST®

Reg. Q-1196-210. Uso veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Gel oral para uso en equinos.

FÓRMULA

Cada ml contiene:

Moxidectina	20 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p.	1 mL

DESCRIPCIÓN

EQUEST® (Moxidectina 2%) gel oral para equinos es un antiparasitario envasado en una jeringa calibrada lista para usar, conteniendo la Moxidectina necesaria para el tratamiento de un equino de hasta 575 kg, a la dosis de 0.4 mg de Moxidectina/kg de peso vivo.

INDICACIONES

EQUEST® es efectivo en el tratamiento contra los siguientes estadios de los parásitos gastrointestinales en caballos y ponis:

Grandes Estróngilos:

Strongylus vulgaris (adultos y estadios arteriales L₄/L₅)
Strongylus edentatus (adultos y estadios tisulares)
Triodontophorus spp. (adultos)

Pequeños Estróngilos (adultos):

Cyathostomum spp.
Cylicostephanus spp.
Cylicocyclus spp.
Coronocyclus spp.
Gyalocephalus capitatus
Cylicodontophorus spp.

Pequeños Estróngilos:

Larvas luminales indiferenciadas

Ciatostomos enquistados:

Larva tardía mucosal de ciatostomo L₃ y L₄

Ascárides:

Parascaris equorum (adultos y estadios larvales L₄)

PRESENTACIÓN

Caja con 1 jeringa.
 Cada jeringa SURE-DIAL contiene 12.2 g de Moxidectina, lo cual es suficiente para tratar un caballo de hasta 575 kg.



Oxiuros:

Oxyuris equi (adultos y estadios larvales L₄)

Ascárides:

Trichostrongylus axei (adultos)

Parásitos largos de la boca del estómago:

Habronema muscae (adultos)

Larvas estomacales del caballo:

Gasterophilus intestinalis (2do y 3er estadio)
Gasterophilus nasalis (3er estadio)

Una administración de EQUEST® gel oral para equinos (Moxidectina) a la dosis recomendada también suprime la producción de huevos de estróngilos durante 84 días. EQUEST® está indicado para su uso en caballos y ponis, incluyendo yeguas y sementales en etapa reproductiva y potros de 6 meses de edad o mayores.

INDICADO EN



EQUEST®

Reg. Q-1196-210. Uso veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Gel oral para uso en equinos.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral


EQUEST® gel oral para equinos está especialmente formulado como un gel palatable el cual es administrado fácilmente a los caballos y ponis. EQUEST® gel es envasado en jeringas listas para usar SURE-DIAL. Las jeringas están calibradas en incrementos de 25 kg hasta 575 kilogramos. Esto asegura la administración de la dosis recomendada de un nivel de 0.4 mg de Moxidectina/kg de peso corporal cuando se selecciona una consistente configuración con el peso del animal.

- **No sub-dosifique.** Asegúrese de que cada animal reciba la dosis completa de acuerdo con su peso corporal actual. La sub-dosificación puede resultar en un tratamiento inefectivo, y propiciar el desarrollo de resistencia del parásito.

Cómo seleccionar la dosis:

Dado que la dosis está basada en el peso del animal, usted necesita emplear una báscula o cinta torácica para determinar el peso de cada animal antes de tratar con EQUEST® gel. Una vez que se sabe el peso, seleccionar la dosis para cada caballo o poni de la siguiente manera:

- Sujetar la jeringa orientando el extremo del tapón hacia la izquierda de manera que usted pueda ver las medidas de pesos y las marcas indicadoras (pequeñas líneas negras). Cada marca indicadora es para 25 kg de peso corporal.
- Gire el disco hasta que la parte izquierda del anillo coincida con el peso del animal.



Cómo administrar EQUEST® a un caballo o poni:

- Asegúrese de que no hay alimento en la boca del animal.
- Quite la tapa de la punta de la jeringa. Guarde la tapa para reúso.
- Coloque la punta de la jeringa dentro de la boca del animal en el espacio interdental.
- Gentilmente empujar el émbolo hasta que tope, depositando el gel en la parte trasera de la lengua.
- Quite la jeringa de la boca del animal y levante la cabeza del animal ligeramente para asegurar que trague el gel.
- Vuelva a colocar la tapa en la jeringa.



Reg. Q-1196-210. Uso veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Gel oral para uso en equinos.

Para medicar un segundo caballo o poni con la misma jeringa:

Si el primer animal que usted trató pesa menos de 575 kg, habrá quedado gel dentro de la jeringa. Usted puede utilizar este gel para tratar otro animal o poni. Para seleccionar la siguiente dosis, adicionar el peso del animal que usted quiere tratar al ajuste de dosis de la jeringa. Por ejemplo, si la jeringa fue usada primero para tratar un animal de 250 kg el anillo blanco está seleccionado para 250 kg. Para tratar al siguiente animal con un peso de 325 kg, mueva el anillo blanco a la marca de 575 kg (250 kg + 325 kg = 575 kg).

Usted necesitará más de una jeringa para tratar a caballos con un peso mayor a 575 kg.

El siguiente cuadro puede ser utilizado como una guía de dosificación:

EDAD	PONI		RAZAS LIVIANAS		RAZAS PESADAS	
	PESO EN KG	DOSIS POR JERINGA	PESO EN KG	DOSIS POR JERINGA	PESO EN KG	DOSIS POR JERINGA
6 meses	95	6	185	3	230-265	2
Adulto	200	2	400	1	+ 500	1

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE DESPARASITACIÓN:

Consulte a su Médico Veterinario para la asistencia en el diagnóstico y tratamiento de los parásitos. Para un adecuado tratamiento contra los parásitos, todos los caballos y ponis diagnosticados deben ser incluidos en un programa de tratamiento estratégico, dando particular atención a los animales de alto rendimiento, yeguas para la cría, sementales y potros. En potros, el tratamiento inicial recomendado, una vez realizado el diagnóstico, debe ser a partir de los 6 meses de edad, después del cual deben ser monitoreados por el Médico Veterinario para identificar un adecuado programa de desparasitación, para lo cual también deberá considerar que EQUEST® es efectivo contra los estadios mucosales de los pequeños estróngilos (ciatostomos enquistados).

EQUEST® gel oral equino cuando se emplea a la dosis recomendada suprime la producción de huevos de estróngilos por 84 días seguido de una sola dosis oral. Este efecto residual contra los estróngilos reduce la contaminación de pastos y provee un periodo de efectividad contra la reinfección en caballos y ponis mantenidos en los mismos pastos.

MODO DE ACCIÓN

EQUEST® gel oral para equinos actúa al interferir con la neurotransmisión del canal mediado por cloro en el parásito. Esto resulta en la parálisis y eliminación del parásito. La Moxidectina es segura para su uso en caballos y ponis debido a que no tiene los mismos efectos dañinos que en el sistema nervioso de los mamíferos.

SEGURIDAD ANIMAL

EQUEST® gel oral para equinos puede ser administrado con seguridad a la dosis recomendada de 0.4 mg/kg de Moxidectina /kg de peso corporal a los caballos y ponis de todas las razas con al menos 6 meses de edad o mayores. Depresión transitoria, ataxia y recumbencia pueden ser vistos cuando se tratan animales muy jóvenes o debilitados.

En esas instancias, se aconsejan cuidados paliativos.

Estudios de seguridad reproductiva demostraron un amplio margen de seguridad cuando el producto es usado en el tratamiento de hembras en estro o gestantes; y en sementales en reproducción.



EQUEST®

Reg. Q-1196-210. Uso veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Gel oral para uso en equinos.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

La resistencia de los parásitos puede ser desarrollada ante cualquier antiparasitario, y ha sido reportada para la mayoría de las clases de desparasitantes. El tratamiento con un desparasitante usado en conjunto con las apropiadas prácticas de manejo de los parásitos del área geográfica y los animales a ser tratados debe disminuir el desarrollo de resistencia del parásito. Exámenes de heces u otras pruebas diagnósticas y la historia del manejo de los parásitos deben de emplearse para determinar si el producto es apropiado para la manada previo al uso de cualquier desparasitante. Posterior al uso de cualquier desparasitante, la efectividad del tratamiento debe de ser monitoreada (por ejemplo, con el uso de la prueba de conteo de la reducción de huevos en heces u otro método apropiado). Una disminución en la efectividad del fármaco sobre el tiempo mediante la reducción del conteo de huevos en heces puede indicar el desarrollo de la resistencia al desparasitante administrado. Su programa de manejo de los parásitos debe de ajustarse de acuerdo con el monitoreo regular.

- EQUEST® gel oral para equinos ha sido específicamente formulado solamente para su uso en caballos y ponis.
- Este producto no debe ser usado en otras especies animales debido a que pueden resultar reacciones adversas, incluyendo la muerte en perros.
- Precauciones extremas deben de tomarse cuando se administra el producto en potros, caballos jóvenes y miniatura; ya que una sobredosis puede resultar en serias reacciones adversas. No usar en animales enfermos, debilitados o bajos de peso.
- No administrar en equinos destinados al consumo humano.
- Este producto no está destinado para uso en humanos.
- No ingerir. Si se traga, inducir el vómito.
- No fumar o comer cuando se dosifica y lavar las manos una vez finalizado el tratamiento.
- Lavar las manos y piel contaminada con jabón y agua.
- Si ocurre contacto accidental con los ojos, enjuagar repetidamente con agua. Si la irritación o cualquier otro síntoma atribuible debido a la exposición de este producto persiste, consulte a su Médico.
- Especiales precauciones deben de tomarse para evitar la liberación del producto al medio ambiente. Tóxico para la vida acuática.
- Consulte al Médico Veterinario.
- Su venta requiere receta médica.

ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase entre 5 y 30 °C.
- Almacenar las jeringas parcialmente usadas con la tapa fuertemente asegurada.
- Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Las jeringas y el contenido no usado deben de desecharse de acuerdo con las regulaciones locales o por incineración.