

EXCEDE®

Reg. Q-1196-118. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.


Suspensión estéril.

FÓRMULA

Cada ml contiene:

Ceftiofur Ácido Libre Cristalino (Suspensión a base de triglicérido caprílico/cáprico y aceite de semilla de algodón).	200 mg
--	--------

Estructura del Ceftiofur Ácido Libre Cristalino:



DESCRIPCIÓN

EXCEDE® Suspensión Estéril es una formulación lista para usarse que contiene Ceftiofur Ácido Libre Cristalino, que es una cefalosporina, antibiótico activo de amplio espectro contra bacterias gram-positivas y gram-negativas incluyendo las cepas productoras de β-lactamasas. Como otras Cefalosporinas, Ceftiofur es bactericida, *in vitro*, resultando de la inhibición de la síntesis de la pared celular.

INDICACIONES

EXCEDE® Suspensión Estéril está indicado para el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias inferiores en equinos, causadas por cepas susceptibles de *Streptococcus equi ssp. zooepidemicus*.

PRESENTACIÓN

Caja con 1 frasco de 100 ml

INDICADO EN



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

- Agitar bien antes de utilizar.
- Administrar dos inyecciones vía intramuscular a equinos, con un intervalo de 4 días de separación, a una dosis de 6.6 mg/Kg de peso corporal.
- Se deben administrar como máximo 20 ml por sitio de inyección. Las concentraciones terapéuticas del fármaco son mantenidas durante 6 días después de la segunda inyección (o un total de 10 días a partir del inicio del tratamiento) contra *Streptococcus equi ssp. zooepidemicus*.

EXCEDE®

Reg. Q-1196-118. Uso Veterinario. Marcas registradas propiedad de Zoetis.

Suspensión estéril.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN**TABLA DE DOSIS PROGRAMADA DE EXCEDE® SUSPENSIÓN ESTÉRIL**

PESO EN KG	VOLUMEN EN DOSIS (ml)	PESO EN KG	VOLUMEN EN DOSIS (ml)	PESO EN KG	VOLUMEN EN DOSIS (ml)	PESO EN KG	VOLUMEN EN DOSIS (ml)
45	1.5	272	9.0	499	16.5	726	24.0
91	3.0	318	10.5	544	18.0	772	25.5
136	4.5	363	12.0	590	19.5	816	27.0
181	6.0	408	13.5	635	21.0	863	28.5
227	7.5	454	15.0	681	22.5	907	30.0

CONTRAINDICACIONES

EXCEDE® Suspensión Estéril está contraindicado en equinos que se conocen son alérgicos al grupo de antimicrobianos de Ceftiofur o a los β -Lactámicos (penicilina y cefalosporinas). Debido a la amplia exposición de los equinos, basada en las propiedades farmacocinéticas de los fármacos, las reacciones adversas requieren cuidados prolongados.

PRECAUCIONES / ADEVERTENCIAS

- Para uso en animales únicamente.
- Consulte al Médico en caso de exposición accidental en humanos.
- No use en equinos que serán destinados para consumo humano.
- Las penicilinas y cefalosporinas pueden causar reacciones alérgicas en individuos sensibilizados. La exposición tópica a dichos antimicrobianos, incluyendo Ceftiofur, puede provocar reacciones alérgicas de leves a severas en algunos individuos.
- La exposición repetida o prolongada puede llevar a la sensibilización.
- Se debe evitar el contacto directo del producto con la piel, ojos, boca y ropa.
- La sensibilización de la piel puede evitarse usando guantes de protección.
- No se debe utilizar en humanos.
- Las personas con una hipersensibilidad conocida a la Penicilina o Cefalosporinas deberán evitar exponerse a este producto.
- En caso de una exposición accidental a los ojos, lave con agua durante 15 minutos.
- En caso de exposición a la piel, lave con agua y jabón, elimine la ropa contaminada, si ocurren reacciones alérgicas (por ejemplo: erupciones en la piel, urticaria, dificultad respiratoria) busque atención médica.
- Consulte al Médico Veterinario.
- Su venta requiere receta médica.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar a una temperatura ambiente controlada de 20 a 25 °C (68 a 77 °F).
- El contenido se debe usar dentro de 12 semanas después de que se extrajo la primera dosis.
- Así como todos los medicamentos, debe ser mantenido fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Disponer del frasco vacío de acuerdo con las regulaciones locales. Co-procesar los envases y todo el contenido no utilizado.